



Aut. San. D.D. n.32404 del 21/12/2001  
Accreditamento Istituzionale  
Rilasciato dalla Regione Umbra



Organismo accreditato da ACCREDITA  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
Certificato n. 12493  
Register Number IT-40740

## Informazioni Ipersensibilità a Farmaci

Dpz 85 Rev 02 del  
18-06-18

- Riportare in un diario tutti i farmaci che hanno provocato una reazione indesiderata. Riportare, oltre al nome del farmaco, la via di somministrazione (per bocca, per iniezione, etc.), il tipo di sintomatologia scatenata, l'intervallo fra la 1<sup>a</sup> somministrazione del farmaco e l'inizio della sintomatologia.
- Riportare nello stesso diario tutti i farmaci assunti che non hanno determinato alcuna sintomatologia indesiderata.
- Assumere farmaci solo se strettamente necessario e ricorrere, se possibile, a quelli già utilizzati, che non hanno indotto reazioni indesiderate.
- Evitare anche i farmaci chimicamente correlati a quelli che hanno dato ipersensibilità. Esempi:
  - Betalattamici, quali penicillina, amoxicillina e cefalosporine.
  - Sulfamidici, tiazidici, solfoniluree, furosemide e disulfiram.
  - Procaina, tetracaina e benzocaina.
  - Aspirina e altri analgesici/ antipiretici.
- L'assunzione di un farmaco nuovo (non utilizzato in precedenza) va fatta sotto controllo medico, ricorrendo possibilmente alla somministrazione orale.
- Evitare quei farmaci notoriamente dotati di notevole potere istamino-liberatore primario, quali la penicillina, l'acido acetil-salicilico, i sulfamidici, gli anestetici locali, i pirazolonici e in genere i farmaci del gruppo PARA, le sostanze iodate, gli estratti d'organo, i barbiturici e morfinici, la vitamina B1, arsenobenzoli, sieri, etc.
- In caso di antibiotico-terapia preferire i seguenti gruppi farmacologici: macrolidi (eritromicina, claritromicina, lincomicina, etc.), fluorochinoloni (ciprofloxacina, levofloxacina), tetracicline (in particolare clorotetraciclina), fosfomicina, rifampicina, cloramfenicolo, aminoglicosidici (gentamicina, tobramicina), nell'ordine.
- Come farmaco analgesico-antipiretico preferire il paracetamolo.
- Tenere in considerazione che, a parte i farmaci, tutto ciò che è assunto per via orale può contenere sostanze chimiche correlate con i farmaci non tollerati (ad esempio, i salicilati sono usati come conservanti nell'industria alimentare per la preparazione d'insaccati e alimenti in scatola).
- Se l'anamnesi è positiva o dubbia per ipersensibilità a un farmaco indispensabile, eseguire i test cutanei (se disponibili) o il test di tolleranza.
- Terapia consigliata per reazioni allergiche sistemiche (orticaria, angioedema, etc.).
  - Antistaminici (esempi: cetririzina, levocitirizina, loratadina, etc.) tutti e tre alla dose di 1-2 compresse al giorno, in unica dose.

Cap.Soc. € 10.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. N° 01604590545

Sede Legale: Strada delle Fratte, 2 - 06132 PERUGIA – Tel. 075/5170245

e-mail: [info@perugiacheckup.it](mailto:info@perugiacheckup.it)

sito: [www.perugiacheckup.it](http://www.perugiacheckup.it)

Cod. Fisc. e Part.IVA 01604590545 Trib.Perugia n.16409



## Informazioni Ipersensibilità a Farmaci

Dpz 85 Rev 02 del  
18-06-18

- Cortisonici (esempio: prednisone 2 compresse da 25 mg).
- In caso di reazione sistemica grave (edema della glottide, shock anafilattico) associare agli antistaminici e ai cortisonici → Fastjekt (adrenalina autoiniettiva) una dose, e recarsi al più presto al più vicino Pronto Soccorso.

Approvazione Direttore Sanitario

Data
<b>18-06-2018</b>