



Aut. San. D.D. n.12404 del 21/12/2001  
Accreditamento Istituzionale  
Rilasciato dalla Regione Umbra



Organismo accreditato da ACCREDITA  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
Certificato n. 12493  
Register Number IT-40740

## Informazioni Allergia alla Puntura di Imenotteri

Dpz 86 Rev 02 del  
18-06-18

### COSA FARE IN CASO DI ALLERGIA ALLA PUNTURA DEGLI IMENOTTERI (API, VESPE, ETC).

#### Suggerimenti sulla prevenzione

- ✓ Indossare fuori di casa vestiti bianchi, maniche lunghe, pantaloni lunghi e cappello. Quando si lavora in giardino usare i guanti.
- ✓ Evitare l'uso dei profumi, cosmetici, spray per capelli e altre sostanze profumate (che attraggono gli insetti).
- ✓ Evitare di cucinare o mangiare all'aperto (l'odore del cibo attira le vespe).
- ✓ Evitare movimenti bruschi.
- ✓ Allontanare l'immondizia da casa il più presto possibile.
- ✓ Tenere le finestre chiuse o usare reti anti-insetti alle finestre.
- ✓ Evitare di avvicinarsi agli alveari e ai nidi delle vespe.

#### Suggerimenti sulla cura da adottare

In caso di **reazioni cutanee** estese (reazione locale nella sede della puntura, orticaria, angioedema):

- ✓ Estrarre con cura (non strappare) il pungiglione con delicati colpi d'unghia o con una pinzetta (il pungiglione viene perso dalle api, ma non dalle vespe e dai calabroni).
- ✓ Disinfettare la zona punta con Amuchina pura.
- ✓ Applicare compresse fredde o ghiaccio per rallentare l'assorbimento del veleno e alleviare il dolore; il prurito può essere controllato con creme a base di crotamidone (Eurax) o di cortisonici (Temetex, Loicoidon, Medrol Veriderm, ecc.).
- ✓ Antistaminici (levocetirizina, desloratadina, ebastina, fexofenadina, mizolastina 1-2 compresse al giorno) e cortisonici (Deltacortone forte 1-2 compresse al giorno) fino alla guarigione.

In caso di **reazione allergica grave** (edema della glottide, shock anafilattico):

- ✓ somministrare
  - **Adrenalina** 0,5 ml intramuscolo nella coscia, ripetibile ogni 5-15 minuti o Fastjekt una dose;
  - **Antistaminici** 1-2 compresse al giorno fino alla guarigione;
  - **Deltacortone** forte 25 mg 2 compresse subito + 1 compressa e mezzo alle ore 8 fino alla guarigione.
- ✓ Rivolgersi al più presto a un pronto soccorso.
- ✓ Rivolgersi in seguito al Perugia Check Up (tel. 0755170245) per gli accertamenti e le eventuali cure.

#### Informazioni importanti sull'uso dei farmaci nelle reazioni gravi (edema della glottide, shock anafilattico)

- 1) L'**adrenalina**, grazie alla rapidità d'azione (agisce entro 2-3 minuti) è l'**unico farmaco salvavita** nelle reazioni gravi e **non è sostituibile**.

Cap.Soc. € 10.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. N° 01604590545

Sede Legale: Strada delle Fratte, 2 - 06132 PERUGIA – Tel. 075/5170245

e-mail: [info@perugiacheckup.it](mailto:info@perugiacheckup.it)

sito: [www.perugiacheckup.it](http://www.perugiacheckup.it)

Cod. Fisc. e Part.IVA 01604590545 Trib.Perugia n.16409



Aut. San. D.D. n.12404 del 21/12/2001  
Accreditamento Istituzionale  
Rilasciato dalla Regione Umbra



Organismo accreditato da ACCREDITA  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 13485:2015  
Certificato n. 12493  
Register Number IT-40740

## Informazioni Allergia alla Puntura di Imenotteri

Dpz 86 Rev 02 del  
18-06-18

### Avvertenze:

- ✓ L'adrenalina e il Fastjekt vanno protetti dalla luce, dal calore e dal congelamento;
  - ✓ L'adrenalina va conservata a temperature <15°C, il Fastjekt può essere conservato a temperature ambiente.
- 2) I cortisonici e gli antistaminici si possono associare all'adrenalina, ma non la possono sostituire. Essi sono farmaci molto efficaci, ma la loro azione non è rapida, anche se usati per via endovenosa. Gli antistaminici non agiscono prima di 15 N 30 minuti e i cortisonici non agiscono prima di 1 N 4 ore. Pertanto sia gli antistaminici che i cortisonici non sono in grado di bloccare una rapida evoluzione, potenzialmente mortale, dello shock anafilattico.
- 3) Il Fastjekt ha il vantaggio, rispetto all'adrenalina, di una maggiore facilità d'uso ma ha lo svantaggio di un costo più elevato (77,90 Euro per una dose di Fastjekt contro 0,26-0,51 Euro per una filala di adrenalina).

Approvazione Direttore Sanitario

Data
<b>18/06/2018</b>

Cap.Soc. € 10.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. N° 01604590545

Sede Legale: Strada delle Fratte, 2 - 06132 PERUGIA – Tel. 075/5170245

e-mail: [info@perugiacheckup.it](mailto:info@perugiacheckup.it)

sito: [www.perugiacheckup.it](http://www.perugiacheckup.it)

Cod. Fisc. e Part.IVA 01604590545 Trib.Perugia n.16409